

اختبار حمل

COMPACT



كيف يعمل الاختبار

عندما تكونين حاملًا ينبع الجسم هرمون المولود hCG (هرمون م似ي بشرى محفز للتناسل)، وتزيد كمية hCG في جسدك خلال المراحل المبكرة من الحمل. ويمكن لاختبار الحمل Clearblue COMPACT اكتشاف الكمييات الصغيرة لهذا الهرمون في وقت مبكر من اليوم المقرر لديه نزول الطمث. ويمكن استخدام Clearblue COMPACT في أي وقت من اليوم وتوفير نتائج موثوقة بها. وتحصل على نتائج أكثر من 99% عند الاستخدام من اليوم المقرر لديه نزول الطمث.

1

إجراء الاختبار

2

- عندما تكونين مستعدة لإجراء الاختبار، افتحي الجراب المعدني الرقيق ثم انزعِي شريحة الاختبار على الفور. تجنبِ الإفراط في تناول السوائل قبل إجراء الاختبار.
- مع ضبط اتجاه الطرف المدبب لأسفل، قومي بإمساك أداة تجميع العينات الماصة في مجرى تدفق البول لمدة 7-3 ثوان فقط.
- بعد مرور 7-3 ثوان، أبعدي أداة تجميع العينات الماصة عن مجرى تدفق البول. مع الإبقاء على توجيه شريحة الاختبار لأسفل، انزعِي الغطاء عن المقبض ثم ضعيه على أحد تجمع العينات الماصة.

بدلاً من ذلك، يمكنك جمع عينة من البول في وعاء نظيف وجاف، ثم غمس أداة تجميع العينات الماصة في البول لمدة 15 ثانية فقط. وينعن عليك اختيار البول على الفور.

قراءة الاختبار

3

- يمكن قراءة النتيجة في أي وقت بين 3 إلى 10 دقائق عقب إغلاق أداة تجميع العينات الماصة من مجرى تدفق البول.
- إذا كان هناك خطأ خطأ أزرق في نافذة الاختبار، فيها يعني أنه "حامل" (قد يكون أحد الخطين بلون أفتح أو أغمق من الآخر).
- الرجاء ملاحظة أنه يجب أن يكون كلا الخطين في نفس الاتجاه ولهم نفس العرض.
- إذا ظهر خط أزرق واحد فقط في نافذة الاختبار، يعني أنه "غير حامل".
- إذا ظهر خط رمادي في بعض الأوقات، وهذا يعني أنه لم يتم إجراء الاختبار بشكل صحيح. وقد يرجع ذلك إلى استخدام كمية كبيرة جدًا من البول. إذا، يتعين عليك إجراء الاختبار مرة أخرى باستخدام عينة بول كما هو مذكور أعلاه في قسم "إجراء الاختبار".
- إذا كنت غير متأكدة من النتيجة أو إذا أشارت النتيجة إلى أنه "غير حامل" وما زال هناك شك في وجود حمل، يتعين عليك الانتظار لمدة 3 أيام على الأقل قبل إعادة إجراء الاختبار باستخدام اختبار جديد.

أسئلة واجابات

4

- هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية على النتيجة؟
- أقرني دائمًا تعليمات جهة التصنيع الخاصة بأي أدوية تتناولينها قبل إجراء الاختبار.
- يمكن أن تؤدي عقاقير الحضوية التي تحتوي على هرمون hCG إلى تناول مضلل (عادةً ما يتم تناول عقاقير الحضوية هذه عن طريق الحقن وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جدًا من تناولها إلى إعطاء نتيجة "حامل" زائف).
- لا تؤثر أدوية الحضوية الأخرى (مثل الكالومفينين) سرات) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أفراد منع الحمل) على النتيجة.

- 2** ما الذي يتغير على قطعه في حالة حصولي على النتيجة "حامل"؟
- إذا كانت النتيجة "حامل"، فتعين عليك استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.
- 3** ما الذي يتغير على قطعه في حالة حصولي على النتيجة "غير حامل"؟
- إذا كان موعد بدء دورة الطمث لديك متاخرًا، وكانت النتيجة "غير حامل"، فقومي بإجراء الاختبار مرة أخرى في خلال ثلاثة أيام، وإذا حصلت على النتيجة "غير حامل" مرة أخرى وما زالت دورتك لم تبدأ بعد، فاستشيري الطبيب.

www.clearblue.com

يتم التخزين في درجة حرارة الغرفة.
يتم حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

يتم التخلص منه مع مخلفات المنزل العالية.
تحتوي على مكونات معدنية (أداة تجميع العينات الماصة).
لا تستهلكي شريحة اختبار جدراًزت تاريخ انتهاء صلاحيتها.
هذا الجهاز لا يستخدم المنزل.

ولا يستخدم في التشخيص العلقي فقط.
كل شريحة اختبار مخصصة لاستخدام مرة واحدة فقط.

جهاز طبي للتثبيت في أداة الاختبار	كود الدفعه	LOT	غير قابل لإعادة الاستخدام
جهاز طبي للتثبيت في أداة الاختبار	دورة الحرارة 2 درجة حرارة 30 درجة مئوية.	دورة الحرارة 2 درجة حرارة 30 درجة مئوية.	جهة التصنيع

يسبي أهمية الاعتناء بـ قيل المولادة على صحة الطفل، توسيي بالمشاركة الطيبة قبل التفكير في الحمل.

للسنفصال من المنتج، الرجال الاتصال بعدم العملاء على العنوان التالي:-

جهة التصنيع
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
جنيف، سويسرا

صنعت في الصين

© 2013 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

جميع الحقوق محفوظة.